



Farmacia y pacientes, innovando juntos



ANÁLISIS COMPARATIVO DEL REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS EN LA DISPENSACIÓN ENTRE DOS FARMACIAS COMUNITARIAS



Benítez Pacheco G, Barris Blundell D, Rangel Hernández L, Sabio Sánchez B, Gimón Carrascal S, Sánchez Gómez R.
Farmacia Barris - Farmacia Zarzuelo - consulta@farmaciazarzuelo.com

Introducción



El objetivo de este estudio ha sido analizar de forma comparativa el registro de las intervenciones farmacéuticas en la dispensación entre dos farmacias comunitarias para conocer si existen diferencias en el perfil de las intervenciones realizadas por los farmacéuticos comunitarios.

Metodología



Estudio descriptivo observacional, llevado a cabo en dos farmacias comunitarias de la provincia de Málaga (Benalmádena y Coín), durante los años 2017 y 2018. El registro empleado es manual y recoge los siguientes aspectos: motivo de la consulta, datos del paciente, actuación farmacéutica y evaluación de la actuación farmacéutica.

Resultados

En la farmacia de Coín (farmacia 1) se han registrado 394 intervenciones, mientras que en la farmacia de Benalmádena (farmacia 2) 144. Los grupos farmacológicos más implicados en la farmacia 1 han sido J01 Antibacterianos para uso sistémico (14,5 %, n=57), R03 Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias (8,6 %, n=34), R06 Antihistamínicos para uso sistémico (7,4 %, n=29), A03 Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino (7,1 %, n=28) (Figura 1). En la farmacia 2 han sido C10 Agentes modificadores de los lípidos (9,7 %, n=14), R03 Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias (8,3 %, n=12), J01 Antibacterianos para uso sistémico (7,6 %, n=11), N06 Psicoanalépticos (7,6 %, n=11) (Figura 2).



Las principales actuaciones farmacéuticas en la farmacia 1 han sido: consejo sobre la administración y utilización del medicamento (43,7 %, n=247), interacción con los alimentos (26,2 %, n=148), explicación de posibles reacciones adversas (15,0 %, n=85), comprobación de la posología (8,8 %, n=50), controles o medidas preventivas para evitar efectos adversos (3,5 %, n=18) e interacciones con medicamentos (3,2 %, n=17) (Figura 3). En la farmacia 2 han sido: detección de reacciones adversas (35,4 %, n=66), consejo sobre la administración y utilización del medicamento (21,5 %, n=40), interacciones con medicamentos (13,4 %, n=25), comprobación de la posología (12,9 %, n=24), controles o medidas preventivas para evitar efectos adversos (11,8 %, n=22), explicación de posibles reacciones adversas (3,2 %, n=6) e interacción con alimentos (1,6 %, n=3) (Figura 4).



En la farmacia 2 se ha conseguido registrar 15 tarjetas amarillas, 14 resultados negativos asociados a la medicación, 11 derivaciones al médico, 6 seguimientos de la presión arterial y 1 revisión de la medicación.

Conclusiones

En la farmacia 1 se registran un mayor número de intervenciones, que se centran principalmente en el consejo de utilización de antibióticos y de medicamentos para patologías respiratorias. Aunque en la farmacia 2 se han efectuado menos registros, este equipo farmacéutico consigue derivar sus actuaciones hacia otros servicios asistenciales, como el seguimiento farmacoterapéutico.